

- [4] Hiroe, M., 1979: Umbelliferae of World, Ariake Book Company, Tokyo.
- [5] Linnaeus, C., 1753: Sp. Pl. 1: 234.
- [6] Liou, S. L., 1979: *Hydrocotyle* L. In R. H. Shan & M. L. Sheh (eds.). Flora Reipubl. Pop. Sin. 55(1): 12—31. (in Chinese)
- [7] Shan, R. H. & S. L. Liou: 1964: On the species of *Hydrocotyle* Linn. Acta Phytotax. Sin. 9: 119—134 + 1 plate. (in Chinese, English summary)

## 弯管列当的补充描述

### THE SUPPLEMENTARY DESCRIPTION ON OROBANCHE CERNUA LOEFLING

弯管列当 *Orobanchae cernua* Loeffling 酷似欧亚列当 *O. cumana* Wallr., 区别是后者花序较长, 花大且排列稀疏。我国有关文献<sup>1)</sup>曾将国产的这个类群鉴定为欧亚列当。实际上, 后者仍应属前者的变异范围。近来我们研究了吉林省白城地区寄生于向日葵上的列当属植物, 并确认它是弯管列当。补充描述如下:

弯管列当(向日葵列当, 二色列当)

***Orobanchae cernua*** Loeffling, Iter. Hisp. 152. 1758; B. Beck in Engler Pflanzenr. IV. 261 (Heft 96):122. 1930; 西藏植物志 4: 389, 1985, p. p.; 张志耘, 植物分类学报 26(5): 395, 1988. — *O. cumana* Wallr. in Orob. Gen. Diask. 58. 1825; 内蒙古植物志 5: 312, 图版 126, 1980.

Ad descr. add.: Plantae singulares vel fasciculatae, 15—70 cm altae. Caules simplices, raro a medio vel parte inferiore ramosi, haud fistulosi vel fistulosi, basi leviter incrassati vel globoso-incrassati, medio 1—2 cm crassi; partibus hypogaeis albidis, epigenis griseo-albis, fulvidis vel rubro-purpureis, in sicco fulvidis vel purpureo-fuscis. Spica 5—35 cm longa. Corollae tubus flavus vel albidus; corollarum lobi lilacini, caesii, caeruleo-purpurei, rosei vel cum tubo lutei, vel albi tantum margine caeruleo-purpurei. Stylus inclusus vel a corolla leviter exsertus.

吉林 (Jilin): 镇赉 (Zhenlai), 英华乡, L. M. Fu (傅丽铭) 04, 06; 白城 (Baicheng), L. M. Fu 010, 011, 014; 洮安 (Tao'an), L. M. Fu 013; 乾安 (Qian'an), L. M. Fu 03, 07, 08; 四平 (Siping), L. M. Fu 05; 长岭 (Changling), 东六号公社, J. H. Zhang (张景和) 01, 03, 04, B. G. Liu (刘宝刚) 02; (标本存 PE)。

张志耘 Zhang Zhi-yun (Institute of Botany, Academia Sinica, Beijing 100044);

傅丽铭 Fu Li-ming (Baicheng Prefecture Research Institute of Agricultural Science, Jilin 137000)

1) 浙江农业大学, 1978; 植物检疫 259—263 页, 上海科学出版社。

本文承王文采教授审阅拉丁文, 特此致谢。

1989.11.29 收稿。